Indicatieve lijst
Aanspraken orthodontische hulp vanuit de basisverzekering

Goedgekeurd als ondersteuning voor beoordeling door zorgverzekeraars op 5-11-2025.

CONGENITALE AFWIJKINGEN, ZIEKTEN EN VERWORVEN AFWIJKINGEN met malocclusie tot gevolg

- Cheilo- en/of gnatho- en/of palatoschisis;
- Craniofaciale afwijkingen geclassificeerd volgens Gorlin & Cohen in: "Syndromes of the head and neck (Oxford University Press, 1990)[1].

- Oligodontie met agenesie van zes of meer blijvende gebitselementen (exclusief derde molaren).

- Juveniele rheumatoïde arthritis;
- Hormonale stoornissen voor zover deze invloed hebben op de groei van het craniofaciale complex, voorbeelden: groeihormoon deficiënties, pubertas praecox;
- Verstoorde groei van het craniofaciale complex t.g.v. radiotherapie en/of chirurgische therapie op jonge leeftijd i.v.m. een oncologische afwijking;
- Progressief groeiende lymphangiomen en haemangiomen;
- Ankylosis van het kaakgewricht;
- Hyperplastische groei van één of beide condyli;
- Trauma van het kaakstelsel waarvoor orthodontische begeleiding nodig is (niet bedoeld wordt trauma van gebitselementen).

SERIOUSLY HANDICAPPING MALOCCLUSIONS

Deze categorie betreft malocclusies gepaard gaande met en/of leidend tot ernstige objectiveerbare blijvende functiestoornissen, die niet door middel van groeimodificatie gecorrigeerd kunnen worden. Veelal zal van een interdisciplinaire behandeling sprake zijn. Te denken valt aan de volgende afwijkingen:

- Hypodontie met agenesie van twee of meer gebitselementen naast elkaar, dan wel van beide cuspidaten in één kaak;
- Mesiorelatie (Klasse III) met een omgekeerde overjet van meer dan 3,5 mm;
- Distorelatie (Klasse II) met een overjet van meer dan 13 mm;
- Laterognathie met ernstige aantoonbare asymmetrie van het gelaat;
- Transversale afwijkingen met verlies van occlusaal contact in de zijdelingse delen;
- Zeer diepe beet met gingivaal of palatinaal trauma, met aantoonbare schade aan het parodontium zoals recessie tot gevolg.
- Geïmpacteerde cuspidaat, gelegen palatinaal in de bovenkaak of buccaal in de onderkaak, waarbij de punt van de cuspidaat voorbij het midden van de radix van de laterale incisief gemigreerd is, dan wel zich apicaal van de apex van de laterale incisief bevindt, zoals zichtbaar op een orthopantomogram.

NB Dit betreft een indicatieve en geen limitatieve lijst

[1] https://books.google.nl/books?id=mSUnOoCvQWAC&pg=PR15&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=1